

MPOX VIRUS

STOP MPOX IN ITS TRACKS: ACT NOW TO PROTECT YOURSELF

VACCINATE



The most common vaccine used for prevention within the U.S. is JYNNEOS.

To be fully vaccinated, you must take two doses four weeks apart.

After the second dose, it takes two weeks for immunity.

The CDC recommends vaccination if:

- You've had recent exposure to mpox or are at higher risk due to STI diagnosis, multiple partners, or high-risk sexual activity.
- You're traveling to areas with known mpox outbreaks and may engage in high-risk activities.
- You work in a lab or healthcare setting with potential orthopoxvirus exposure.

Visit cdc.gov/mpox/vaccines for more information.

STOP THE SPREAD



Do not touch the rash or scabs of a person with mpox.

Do not kiss, hug, cuddle, or have sex with someone with mpox.

Do not share utensils or cups with someone with mpox.

Be mindful when handling or touching bedding, towels, or clothing of others.

Pregnant people can spread the virus to their fetus through the placenta.

ISOLATE



If infected, isolate for 21 days, until the rash is gone, or you have been evaluated by your healthcare provider.

SCHEDULE

Call us to schedule your vaccine appointment at 832-927-7350.

VIRUELA SÍMICA

**DETENGA LA VIRUELA SÍMICA
(MPOX EN INGLÉS):
ACTÚE AHORA Y PROTÉJASE**

VACÚNESE



La vacuna de prevención más común en los Estados Unidos es JYNNEOS.

Para estar vacunado completamente, debe tomar dos dosis con cuatro semanas de diferencia.

Después de tomar la segunda dosis, hay que esperar dos semanas para desarrollar inmunidad.

Los CDC recomiendan la vacunación si:

- Ha tenido exposición reciente a la viruela símica (en inglés mpox) o corre mayor riesgo debido a un diagnóstico de infección de transmisión sexual, tiene múltiples parejas o actividad sexual de alto riesgo.
- Va a viajar a zonas con brotes conocidos de mpox y podría participar en actividades de alto riesgo.
- Trabaja en un laboratorio o lugar de atención médica con posible exposición a ortopoxvirus.

Visite **HYPERLINK** "<https://www.cdc.gov/mpox/vaccines>" [cdc.gov/mpox/vaccines](https://www.cdc.gov/mpox/vaccines) para más información

ALTO



No toque la erupción o las costras de una persona con viruela símica.

No bese, abrace, o acaricie ni tenga relaciones sexuales con alguien con viruela símica.

No comparta cubiertos o tazas con otros

Tenga cuidado al manipular o tocar ropa de cama, toallas o ropa de otros.

Las personas embarazadas pueden transmitir el virus a su feto a través de la placenta.

AÍSLESE



Si está infectado, aíslese durante 21 días o hasta que la erupción desaparezca.

HORARIO

Para obtener una vacuna, llame al 832-927-7350 para hacer una cita.